

Nádory jícnu

Tumory jícnu tvoří poměrně rozsáhlou kapitolu, přičemž jako u ostatních orgánů je můžeme rozdělit na **benigní** (nezhoubné) a **maligní** (zhoubné) a dále na **primární** (rostoucí v místě svého vzniku) a **sekundární** (metastázy).

Benigní nádory

Z povrchového epitelu mohou vznikat papilomy. Mají vzhled přisedlých polypů, jejich vyvolávající příčinou může být HPV virus a dráždění jícnu při chronické [refluxní ezofagitidě](#). Z hlediska rizika rozvoje malignity jsou hodnoceny jako low-grade.

Benigní mezenchymové nádory vychází z podslizniční vrstvy nebo ze svalové vrstvy stěny jícnu. Jedná se o jícnové varianty tumorů jako jsou **lipomy** (tuková tkáň), **hemangiomy** (cévní struktury), **lymfangiomy** (lymfatické cévy), **leiomyomy** (hladká svalovina) a **fibromy** (vazivová tkáň).

Maligní nádory

Základním tumorem této skupiny je [karcinom jícnu](#), z něhož jsem vyčlenil přechodný tumor mezi jícnem a žaludkem, tzv. [adenokarcinom gastroezofageální junkce](#). Dále se nesmí Kromě něj je nutno zmínit i **lymfomy**, které jsou však v oblasti jícnu relativně vzácné. Vyskytovat se mohou velkobuněčné lymfomy, MALT lymfomy i Hodgkinův lymfom. V jícnu můžeme najít i **melanom**, spíše však jako sekundární metastatické ložisko. Velmi raritně byly v jícnu popsány **sarkomy**.