

Poléková ezofagitida

Pill-induced ezofagitida (poléková ezofagitida) patří mezi záněty jícnu způsobené léčivý. Řada léků působí agresivně na sliznici jícnu za předpokladu, že delší dobu zůstávají v kontaktu s konkrétní oblastí sliznice. Na podkladě kaustického (kyselost či zásaditost) nebo přímého cytotoxického působení na buňky jícnu pak vznikají defekty různého rozsahu.

Příčiny

Vyšší riziko mají pacienti, kteří užívají léky vleže, a nedostatečně je zapíjejí vodou. Zvýšená četnost poškození jícnu lékovými tabletami existuje u nemocných s [dysmotilitními poruchami](#) (např. [achalasie](#)), **stenózami** (komplikace [refluxní choroby](#), [tumory jícnu](#)) a s [eozinofilní ezofagitidou](#). Mezi nejrizikovější léčiva patří **antibiotika** (zejména tetracykliny), **nesteroidní antirevmatika**, **preparáty kalia** (kalnormin, KCl) a **bisfosfonáty**. Kromě potenciální chemické agresivity léku je nutno mít na paměti i velikost tablety, větší tablety zvyšují riziko "zaseknutí se" léku.

Projevy

V klinickém obrazu bývá typická **bolest na hrudi** a **dysfágie** (poruchy polykání) vzniklá do několika hodin po užití léků a přetrvávající po několik dnů. Ze závažných komplikací byly popisovány **perforace**, tvorba **striktur**, **krvácení**.

Diagnostika

Kromě anamnézy se zaměřením na obtíže a na informace o užívaných lécích má největší význam [ezofagogastroskopie](#). Endoskopický obraz může být značně pestrý - od povrchových erozí až po rozsáhlé jícnové vředy a stenózy. U těžších forem může být nález zaměněn za maligní tumor a jsou nutné odběry biopsií.

Léčba

Základem léčby je zabránit dalšímu poškození důslednou prevencí (omezení rizikových léciv, zapíjení tablet tekutinami, užívání léků spíše vsedě a ne vleže), jinak se lehká poškození hojí samovolně. K urychlení hojení lze

někdy dočasně podávat **blokátory protonové pumpy** k eliminaci vlivu případné [refluxní choroby](#). Komplikace se řeší endoskopicky (stenózy) a-nebo chirurgicky (perforace). Za předpokladu, že zhoršená pasáž tablet je způsobena další chorobou (viz. příčiny), je nutné řešit i tuto chorobu.