Poruchy motility jícnu

Poruchy motility (hybnosti) se projevují zhoršenou pasáží soust a vedou k různým formám dysfágie (poruchy polykání).

Obecně řečeno je nutné rozlišit **poruchy motility horního jícnu**, které souvisí s postižením jeho příčně pruhované svaloviny včetně poruchy horního jícnového svěrače a na **poruchy motility distálního jícnu**, kde je přítomna hladká svalovina.

Poruchy motility horního jícnu

Do této skupiny spadá tzv. orofaryngeální dysfágie, což je porucha hybnosti jícnu v anatomické oblasti horního jícnového svěrače.

Poruchy motility distálního jícnu

Do této známější skupiny řadíme nemoci jako je achalázie, spastické poruchy jícnu (difuzní spasmus jícnu, louskačkový jícen) a postižení jícnu u některých systémových chorob jako je **sklerodermie** a **diabetes mellitus**.

Jak již bylo řečeno výše, je základním projevem poruchy motility jícnu dysfágie, neboli porucha polykání. Můžeme ji rozlišit na horní a dolní. U **horní dysfágie** je pocit váznutí sousta lokalizován spíše do oblasti krku a bývá doprovázen aspiracemi (vdechnutím) potravy s kašlem a záněty dýchacích cest. **Dolní dysfágie** je spojená s distálním jícnem, nepříjemný pocit je vnímán spíše níže v oblasti hrudníku.